

Secourisme Info 13



numéro 13
Février 2005

LES PRODUITS ANTISEPTIQUES DES V.S.A.V.

Respecter le date limite d'utilisation et les indications de chaque produit

Unidose : 1 dose = 1 soin

Ne jamais mélanger plusieurs antiseptiques
En cas de doute, avis du médecin régulateur

BETADINE dermique 10% (unidose 10 ml)

Antiseptique par *voie cutanée*

- des plaies et brûlures superficielles et peu étendues
- de la peau avant geste opératoire

CI : intolérance ou allergie à l'iode, enfant moins de 30 mois



HIBIDIL (Chlorhexidine alcool.) (unidose 15 ml)

Antiseptique par *voie cutanée* de la peau et des plaies superficielles

Utilisation possible chez le nouveau-né et l'enfant

Ne pas utiliser sur des brûlures



ALCOOL MODIFIE 70 % (125 ml)

Conservation sans durée

Antiseptique, antibactérien par *voie cutanée*

Désinfection des plans cutanés,
en l'absence de plaie



EAU OXYGENEE 10 volumes (125 ml)

Conservation *10 jours après ouverture*

Antiseptique, antibactérien par *voie locale*

Nettoyage des plaies et / ou abrasions dermiques

Traitements des petites hémorragies capillaires



CLINOCEL (100 ml)

Conservation *28 jours après ouverture*

Solution désinfectante des mains (bactéricide, fongicide, virucide)

(soins d'urgence, succession de gestes contaminants, entre deux patients)

Ne dispense pas le lavage des mains

Efficace en 30 secondes, ne pas essuyer,

se frictionner les mains jusqu'à évaporation

